



Check for updates

<https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-1-328-348><https://www.zoobank.org/References/FD61A7B0-7D3E-43F9-8CA0-D7444FB5FDC0>

УДК 598.2:591.54:502.7 (571.62)

## О встречах периферийных и залетных видов птиц на территории Хабаровского Края

В. В. Пронкевич✉, С. И. Бурдин

Хабаровский федеральный исследовательский центр Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, ул. Дзержинского, д. 54, 680000, г. Хабаровск, Россия

### Сведения об авторах

Пронкевич Владимир

Валентинович

E-mail: [vp\\_tringa@mail.ru](mailto:vp_tringa@mail.ru)

SPIN-код: 2313-7958

ORCID: 0000-0002-9115-267X

Бурдин Сергей Иванович

E-mail: [vp\\_tringa@mail.ru](mailto:vp_tringa@mail.ru)

**Аннотация.** Материалы для данной статьи были собраны авторами и нашими постоянными респондентами в разных районах Хабаровского края. Сообщается информация о встречах восьми видов птиц, находящихся на северной периферии ареала, и дальних залетах девяти видов птиц. Из них шесть видов внесены в Красную книгу России (Павлов 2021) и пять видов — в Красную книгу Хабаровского края (Воронов 2019). Впервые за всю историю орнитологических исследований на территории региона зарегистрированы залеты горного гуся (*Anser indicus*), черного грифа (*Aegypius monachus*), документально (при помощи фотографий) подтверждены залеты каравайки (*Plegadis falcinellus*), огаря (*Tadorna ferruginea*), белоглазого нырка (*Aythya nyroca*). Представленные материалы дополняют имеющиеся сведения о состоянии авифауны региона.

**Права:** © Авторы (2026). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

**Ключевые слова:** Хабаровский край, периферийные виды, залетные виды, численность птиц, миграции, гнездовой ареал

## About registrations of peripheral and stray bird species in Khabarovsk Krai

V. V. Pronkevich✉, S. I. Burdin

Khabarovsk Federal Research Center, Institute of Water and Ecology Problems, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 54 Dzerzhinskogo Str., 680000, Khabarovsk, Russia

### Authors

Vladimir V. Pronkevich

E-mail: [vp\\_tringa@mail.ru](mailto:vp_tringa@mail.ru)

SPIN: 2313-7958

ORCID: 0000-0002-9115-267X

Sergey I. Burdin

E-mail: [vp\\_tringa@mail.ru](mailto:vp_tringa@mail.ru)

**Abstract.** The materials for this article were collected by the authors and our regular respondents in various areas of Khabarovsk Krai. Information is reported on encounters with nine bird species located on the northern periphery of their ranges, and on long-distance flights of eight bird species. Six of these species are listed in the Red Data Book of Russia (Pavlov 2021) and five in the Red Data Book of Khabarovsk Krai (Voronov 2019). For the first time in the history of ornithological research in the region, flights of the Bar-headed Goose (*Anser indicus*) and Black Vulture (*Aegypius monachus*) have been recorded, and the flights of the Glossy Ibis (*Plegadis falcinellus*), Ruddy Shelduck (*Tadorna ferruginea*), and Ferruginous Duck (*Aythya nyroca*) have been documented (using photographs). The presented materials supplement the existing information on the state of the region's avifauna.

**Copyright:** © The Authors (2026). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia. Open access under CC BY-NC License 4.0.

**Keywords:** Khabarovsk Krai, peripheral species, stray species, bird abundance, migrations, breeding range

## Введение

Территория Хабаровского края простирается с севера на юг на 1800 км.

Регион находится на окраине Евразийского материка, граничит с Приморским краем, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной областями, Республикой Саха (Якутия), КНР и омывается водами Охотского и Японского морей. Субмеридиональное расположение региона обуславливает наличие значительного количества северных и южных границ гнездовых ареалов различных видов птиц.

В настоящей работе приведены ранее не публиковавшиеся сведения о встречах краеареоальных и залетных видов птиц, собранные в различных районах Хабаровского края.

## Методика и материалы

Материалы для данной статьи были собраны авторами и нашими постоянными респондентами в разных районах Хабаровского края. Значительная часть находок подтверждена фотографическими материалами.

Основные сведения о близости границ ареалов исследованных нами видов к территории Хабаровского края получены из работ В. Г. Бабенко (Бабенко 2000), Л. С. Степаняна (Степанян 2003), В. А. Нечаева, Т. В. Гамовой (Нечаев, Гамова 2009).

В тексте статьи последовательность расположения видов, их русские, английские и латинские названия приведены в соответствии с отечественными сводками (Коблик и др. 2006; Михайлов, Коблик 2025).

## Результаты и обсуждение

**Египетская цапля** *Bubulcus ibis*. Очень редкий залетный вид Хабаровского края. Залет данного вида был зафиксирован 22.05.2024 в с. Чля (Николаевский район). От местных жителей села получена фотография птицы, сидящей на поленнице дров, позволяющая идентифицировать вид (рис. 1). Это третий и самый северный пункт встречи египетской цапли на терри-

тории региона. Ранее залетных птиц регистрировали значительно южнее на рр. Гур и Пир в 430 км и в 570 км соответственно (Пронкевич и др. 2011b; Пронкевич 2013).

Ближайшим местом нерегулярного размножения египетской цапли является Приханкайская низменность (Глуценко и др. 2016).

**Большая белая цапля** *Casmerodius albus*. На территории Хабаровского края известно лишь одно место размножения большой белой цапли на острове с местным названием Цаплиный, расположенном в нижнем течении р. Уссури на территории Вяземского района. Данный остров входит в состав ООПТ регионального значения природный парк «Шереметьевский» (Пронкевич 2015; Крюкова и др. 2016). В 2013 г. здесь в смешанной колонии большого баклана *Phalacrocorax carbo*, кваквы *Nycticorax nycticorax* и серой цапли *Ardea cineria* было учтено 338 гнезд большой белой цапли.

На территории региона на север от гнездового ареала количество регистрируемых кочующих птиц постепенно убывает. Наиболее крупные кормовые скопления отмечаются в позднелетний и осенний периоды. В начале октября 2015 г. скопление больших белых цапель с численностью более 100 особей нами отмечено на обсохшем ложе оз. Гасси (Нанайский район). Птицы не менее десяти дней кормились на данном участке, после чего отлетели.

В предыдущей нашей заметке мы сообщали о том, что этот вид в качестве залетного для самого северного Охотского района края стал регистрироваться с 2007 г. (Пронкевич, Мороков 2012). Случаи залетов в северные районы региона продолжают фиксироваться.

В 2019 г. одиночная большая белая цапля в течение октября вплоть до наступления достаточно сильных морозов периодически курсировала с морского побережья над п. Охотск на прибрежные моховые болота и обратно. В этом же году одну птицу охотники отмечали на крупном таежном озере в 200 км западнее п. Охотск.



**Рис. 1.** Египетская цапля *Bubulcus ibis* в с. Чля (Николаевский район), 22.05.2024. Фото А. В. Каплунова

**Fig. 1.** Cattle Egret *Bubulcus ibis* in Chlya village (Nikolaevsky District), 22.05.2024. Photo by A. V. Kaplunov

В мае 2024 г. одна птица была отмечена на окраине с. им. Полины Осипенко. Представлена фотография птицы технического качества, позволяющая определить вид (рис. 2).

Считается, что большая белая цапля начинает размножаться с третьего года жизни (Грищенко 2011). Вероятно, основу залетных в северные районы края птиц составляют непополовозрелые особи.

**Колпица** *Platalea leucorodia*. Редкий залетный вид Хабаровского края. Известен единственный случай размножения колпицы — в 1964 г. (в разных публикациях автора указываются 1964 или 1965 г.), когда было найдено гнездо с кладкой у с. Малышево (Хабаровский район) (Росляков 1974; 1981). Этим же автором по паре колпиц регистрировалось в окрестностях оз. Болонь в 1968 и 1969 гг.

Позднее, вероятно, залетных птиц несколько раз отмечали на Среднеамурской низменности в районе оз. Киотеми вблизи г. Хабаровск, в окрестностях с. Князе-Волконское (Хабаровский район) (Пронкевич и др. 2011а; Пронкевич 2015) и на морском побережье пролива Татарский в устье р. Май на территории Советско-Гаванского района (Пронкевич и др. 2016). Также шесть и четыре птицы отмечали на левом берегу р. Амур у пр. Эморон (Нанайский район) весной 2017 и 2018 гг. соответственно (Пронкевич 2019).

В весенний и осенний периоды 2021–2025 гг. две-три колпицы ежегодно регистрировались на северной окраине г. Амурск на водоемах-отстойниках бывшего целлюлозно-бумажного комбината.

Учитывая увеличение в последние годы количества встреч этого вида, логично



**Рис. 2.** Большая белая цапля *Casmerodius albus* на окраине с. им. Полины Осипенко. Фото Е. В. Васильченко

**Fig. 2.** Great (White) Egret *Casmerodius albus* on the outskirts of Polina Osipenko village. Photo by E. V. Vasilchenko

предположить возможность размножения птиц на Среднеамурской низменности.

У нас появилась также ретроспективная информация о залете колпицы в Охотский район. В 1970-е гг. в мае ослабевшая после прошедшей метели птица была отловлена руками в окрестностях п. Охотск. После небольшой передержки колпица была выпущена на волю. Птица в короткие сроки оправилась и достаточно уверенно улетела.


**Каравайка** *Plegadis falcinellus*. Очень редкий залетный вид Хабаровского края. Залет шести птиц был зарегистрирован на железнодорожной станции Хурба (Комсомольский район) во второй половине мая 1959 г. (Росляков 1974). Птицы в течение дня держались на огороде.

Взрослая каравайка была встречена 19.08.2021 и сфотографирована при помощи камеры с телефона одним из авторов

данной статьи в придорожной канаве на автотрассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, в 5 км северо-восточнее поворота на с. Троицкое (Нанайский район) (рис. 3).

Современный гнездовой ареал охватывает часть восточного побережья Северной Америки, часть Восточной Африки, юг Франции, северо-восток Италии, от Хорватии, Венгрии и Албании через Причерноморье, Приазовье, Малую Азию, среднюю часть Ирака, Прикаспий, Казахстан, южное подножие Гималаев и север Индии до юга Мьянмы, п-ова Малакка, до островов Индонезии, Филиппин и Австралии (Степанян 2003).

Примечательно, что на территориях, сопредельных с Хабаровским краем регионов, где интенсивность орнитологических исследований значительно выше, данный вид никогда не отмечался.



**Рис. 3.** Каравайка *Plegadis falcinellus*. Обочина автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре (Нанайский район), 19.08.2021. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 3.** Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*. Roadside between Khabarovsk and Komsomolsk-on-Amur (Nanai District), 19 August 2021. Photo by S. I. Burdin

**Белый гусь** *Anser caerulescens*. Очень редкий пролетный или залетный вид Хабаровского края (Бабенко 2000). По сохранившейся в охотничьем сообществе п. Охотск информации, в 1970-х гг. два белых гуся были добыты в 13 км западнее вышеназванного населенного пункта, недалеко от п. Новое Устье.

В мае 2020 г. две стайки белых гусей, состоящие из 9 и 15 особей продолжительное время летали вдоль морского побережья в районе п. Охотск. В этом же году в период весенней охоты (третья декада мая) пять особей были добыты в нижнем течении р. Охота (13 км западнее п. Охотск), две особи — на р. Урак (24 км западнее п. Охотск), одна птица — на р. Чильчикан (40 км западнее п. Охотск). Из добытых в 2020 г. белых гусей были изготовлены три чучела, которые в настоящее время хра-

нятся в Охотском краеведческом музее. Эта информация подтверждается фотографиями чучел птиц из музея (рис. 4).

Примечательно, что в другие годы белый гусь на территории Охотского района не регистрировался. Многие охотники, ежегодно занимающиеся охотой на водоплавающих птиц, его даже никогда не видели. Это подтверждает мнение С. Б. Розенфельд (Розенфельд 2025) о том, что, несмотря на значительное увеличение численности белых гусей на о. Врангеля за последние 25 лет с 60 тыс. до 700 тыс. особей, укрепления малочисленных азиатских зимовок не происходит.

Белый гусь гнездится в тундрах Северной Америки, северо-западной Гренландии, северо-восточной Сибири в основном на о. Врангеля. Небольшие поселения существуют на материковом побережье от Чукотки до р. Индигирка. Зимовки находятся на Севе-



**Рис. 4.** Три чучела белого гуся *Anser caerulescens*. Экспозиция Охотского краеведческого музея. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 4.** Three mounted specimens of Snow Goose, *Anser caerulescens*. On display at the Okhotsk Museum of Local History. Photo by S. I. Burdin

роамериканском континенте, в Японии, на п-ове Корея и в КНР (Нечаев, Гамова 2009).

В Амурской области и Приморском крае вид является очень редким пролетным, регистрируется не ежегодно (Антонов, Дугинцов 2018).


**Горный гусь** *Anser indicus*. Единственный известный случай залета на территорию Хабаровского края горного гуся был зарегистрирован в г. Николаевск-на-Амуре. Взрослая внешне здоровая, летающая птица в течение трех недель, с 20.05 по 10.06.2024, держалась у основания дамбы, ведущей в морской порт (рис. 5). Горный гусь доверительно относился к многочисленным наблюдателям, которые подкармливали его зерном.

От местных жителей нами получено несколько видеосюжетов, позволяющих определить видовую принадлежность птицы.

Горный гусь гнездится на горных озерах Центральной Азии, в том числе на юге Горного Алтая, Тувы и в южном Прибайкалье, зимует в Индии, Пакистане, Бирме и Бангладеш (Блохин 2011а).

В разные годы несколько залетов этого вида было зафиксировано на территорию Приморского края (Глуценко и др. 2016).

**Сухонос** *Anser cygnoides*. Пролетный и гнездящийся вид Хабаровского края (Пронкевич 2016). Очень редкий залетный вид Охотского района. В мае 2020 г. в период весенней охоты двумя охотниками в окрестностях п. Охотск было добыто по одному сухоносу. Другая птица была добыта там же 02.07.2023. Нам была представлена фотография, позволяющая определить видовую принадлежность птицы (рис. 6). У добытого сухоноса был необычный окрас — на груди имелся симме-



**Рис. 5.** Горный гусь *Anser indicus* в г. Николаевск-на-Амуре, май 2024. Фото М. А. Федосеева

**Fig. 5.** Bar-headed Goose *Anser indicus* in Nikolaevsk-on-Amur. May 2024. Photo by M. A. Fedoseyev

тричный белый галстук. В результате консультации с рядом специалистов по поводу причин возникновения этой аномалии мы не нашли ответа.

**Огарь** *Tadorna ferruginea*. Очень редкий залетный вид Хабаровского края. Одиночный ♂ данного вида был зарегистрирован в пригороде Амурска на небольшом водоеме в период 16–18.10.2025. В последний день встречи птица была застрелена шальным охотником. Один из авторов данной статьи проезжал мимо места добычи и упросил охотника передать ему птицу, из которой впоследствии было изготовлено чучело для краеведческого музея г. Амурск (рис. 7).

Кроме того, по опросным сведениям, полученным в 1980 г., изредка отдельные особи огаря отмечались на оз. Эворон (Солнечный район Хабаровского края) (Бабенко 2000).

Гнездовой ареал вида охватывает степной юг Евразии от Юго-Восточной Европы до Забайкалья. На российской территории гнездится на юге Западной Сибири, Алтае, в Туве, Прибайкалье и Забайкалье (Михайлов, Коблик 2025).

Для Еврейской автономной и Амурской областей в настоящее время огарь является редким залетным видом. В конце про-

шлого столетия он приводился в качестве редкой гнездящейся птицы южных районов этих областей (Аверин 2014; Антонов, Дугинцов 2018).

Для Приморского края вид приводится как пролетный и зимующий (Глуценко и др. 2016).

На северо-восточном побережье о. Сахалин два залетных огаря были добыты осенью 1932 г. (Воробьев 1954).

**Черная кряква** *Anas poecilorhyncha*. Редкий гнездящийся вид Хабаровского края. Единственный подтвержденный случай размножения был зафиксирован в Нанайском районе (Пронкевич 2019). Залетная птица была встречена нами 17.07.2016 на р. Эльгандё, впадающей в зал. Константина Охотского моря.

В Охотском краеведческом музее хранится чучело черной кряквы, изготовленное одним из авторов данной статьи (рис. 8). Птица была добыта 27.09.2007 в окрестностях п. Охотск из стайки, состоящей преимущественно из обыкновенных крякв. В мае 2020 г. в период весенней охоты одна черная кряква была добыта в окрестностях п. Охотск и осмотрена нами.

В сопредельной Магаданской области, расположенной севернее Хабаровского



**Рис. 6.** Сухонос *Anser cygnoides*, добытый в окрестностях п. Охотск, 02.07.2023. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 6.** Swan Goose *Anser cygnoides*, killed in the vicinity of Okhotsk village on 2 July 2023. Photo by S. I. Burdin



**Рис. 7.** Чучело огаря *Tadorna ferruginea*, добытого в окрестностях г. Амурск, 18.10.2025. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 7.** Mounted Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea*, killed in the vicinity of Amursk on 18 October 2025. Photo by S. I. Burdin

края, данный вид также является редким залетным. Известны два случая залета (Кондратьев 2014; Дорогой 2016).

Для о. Сахалин черная кряква является редкой гнездящейся птицей (Нечаев 1991; Тиунов, Блохин 2011).

**Серая утка** *Anas strepera* Linnaeus, 1758. Редкий гнездящийся вид Хабаровского края (Бабенко 2000; наши данные).

Для северного Охотского района края известен лишь один случай добычи серой утки, который произошел в середине мая 2017 г. на р. Чильчикан (в 40 км западнее п. Охотск). Из стайки птиц, состоящей преимущественно из шилохвости, был добыт ♂ серой утки. Позднее из этой птицы было изготовлено чучело, которое хранится в Охотском краеведческом музее (рис. 9).

На юге Магаданской области залет серой утки зафиксирован также однаж-

ды — пара птиц встречена 13.06.2020 на одном из водоемов в окрестностях Ольской лагуны в Тауйской губе (Дорогой 2020).

**Белоглазый нырок** *Aythya nyroca*. Очень редкий залетный вид региона. Впервые залет ♂ белоглазого нырка в Хабаровском крае был отмечен 07.06.2003 в бухте Сомон в проливе Невельского Японского моря (Тиунов 2005).

В 2025 г. на территории края этот вид регистрировался дважды. В пригороде Амурска ♂ был добыт 10.05.2025. Птица была отстреляна из небольшой стайки, состоящей преимущественно из хохлатой чернети (*Aythya fuligula*). Чучело этой птицы хранится в ИВЭП ДВО РАН (г. Хабаровск) (рис. 10). Другой ♂ был добыт 25.09.2025 в окрестностях с. Смирновка Хабаровского района (рис. 11).



**Рис. 8.** Чучело черной кряквы *Anas poecilorhyncha*, добытой в окрестностях п. Охотск, 27.09.2007. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 8.** Mounted Chinese Spotbill *Anas poecilorhyncha*, killed in the vicinity of Okhotsk village on 27 September 2007. Photo by S. I. Burdin

В Приморском крае белоглазый нырок единственный раз был зарегистрирован в г. Владивосток в марте 2025 г., когда был отмечен ♂ (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2025; Голубева и др. 2025).

Современный гнездовой ареал вида представляет собой сеть очагов от Северной Африки и юга Испании до Западного Китая и Монголии. В России, на северной окраине ареала, размножается в Приазовье, Предкавказье и в Нижнем Поволжье (Блохин 2011b).

Для этого вида характерны дальние залеты за пределы гнездовой и зимовочной частей ареала, в частности, на восток эти утки периодически проникают до Восточного Китая, Корейского полуострова и Японии (Волковская-Курдюкова, Курдюков 2025).

**Черный коршун** *Milvus migrans*. В мире вид распространен очень широко, его аре-

ал включает Евразию, Африку, Австралию, острова Индийского океана.

В южных и центральных районах Хабаровского края черный коршун является обычным гнездящимся видом (Бабенко 2000; Pronkevich, Voronov 2014; Пронкевич, Воронов 2015). На российском Дальнем Востоке северные пределы распространения вида изучены недостаточно (Степанян 2003).

В 2018–2022 гг. мы регулярно регистрировали черного коршуна в устье р. Иска на заливе Счастья (Николаевский район), где предполагается его размножение (Пронкевич и др. 2024).

В Охотском районе вид является редким залетным. Известны три случая встречи черного коршуна в п. Охотск: в июне 1997 г. отмечена парящая птица; в сентябре 2011 г. — сидящая на детской качели; в сентябре 2020 г. одна птица была добыта охотником.



**Рис. 9.** Чучело серой утки *Anas strepera*, добытой в середине мая 2017 г. на р. Чильчикан. Экспозиция Охотского краеведческого музея. Фото С. И. Бурдина

**Fig. 9.** Mounted Gadwall *Anas strepera*, killed in mid-May 2017 on the Chilchikan River. On display at the Okhotsk Museum of Local History. Photo by S. I. Burdin

Из последней птицы было изготовлено чучело, которое находится в экспозиции Охотского краеведческого музея (рис. 12).

Для южной части Магаданской области известны два случая залета черного коршуна (Слепцов 2018).

**Черный гриф *Aegypius monachus*.** В августе 2025 г. ослабевший черный гриф был обнаружен на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края вблизи п. Ургал. Специалистами управления охотничьего хозяйства птица была передана в зоосад им. В. П. Сысоева (г. Хабаровск).

По опросным сведениям, полученным от сотрудников зоосада, оказалось, что это уже не первый случай залета черного грифа на территорию Хабаровского края. Осенью 2017 г. в этот же зоосад была доставлена птица, подобранная раненой вблизи г. Николаевск-на-Амуре.

Гнездовой ареал черного грифа простирается от Северо-Западной Африки и Юго-Западной Европы (Пиренейский полуостров) к востоку до Монголии и горных районов Восточного Китая (Степанян 2003). Общая мировая численность вида составляет 7800–10500 пар, в пределах российской части ареала она может быть оценена в 150–200 пар (Тильба 2021).

Для соседних с Хабаровским краем Еврейской автономной и Амурской областей также является редким залетным видом (Аверин 2014; Антонов, Дугинцов 2018).

Данный вид на Дальнем Востоке России еще недавно был обычен на зимовках в Приморье, где его численность в зимний период 1985/1986 гг. достигала 650 особей. В 90-х гг. прошлого столетия в связи с деградацией звероводческих хозяйств, «оставлявших» кормовые отходы грифам,



**Рис. 10.** Чучело самца белоглазого нырка *Aythya nyroca*, добытого в пригороде Амурска, 10.05.2025. Фото В. В. Пронкевича

**Fig. 10.** Mounted male Ferruginous Duck *Aythya nyroca*, killed in the suburbs of Amursk on 10 May 2025. Photo by V. V. Pronkevich

численность вида стала снижаться (Кальницкая и др. 2015). В настоящее время гриф является здесь малочисленным зимующим видом (Глушченко и др. 2016).

В Магаданской области единственный залет черного грифа был зафиксирован 31.08.2011 (Дорогой 2013).

**Чибис** *Vanellus vanellus*. В южной и центральной частях Хабаровского края вид является обычным гнездящимся. Предполагалось, что северным пределом распространения чибиса является устье р. Амур (Бабенко 2000; Нечаев, Гамова 2009). Нами северные находки размножающихся птиц были сделаны в заливах Счастья и Тугурский Охотского моря (Pronkevich 1998; Пронкевич и др. 2024). Кроме того, имеется информация о встрече пары чибисов в с. Аян (Аяно-Майский район) во второй половине мая 2023 г. (Шиенко, Парфено-

ва 2025). В Охотском районе вид известен в качестве очень редкого залетного. Известны два случая залета: во второй половине мая 1985 г. стайка из 15 особей держалась около п. Новое-Устье, расположенного в 13 км западнее п. Охотск; 22.09.2006 стая чибисов, состоящая из 17 особей, отмечена на моховых болотах в окрестностях п. Охотск.

**Вальдшнеп** *Scolopax rusticola*. В южных и центральных районах Хабаровского края вид является редким или обычным гнездящимся (Бабенко 2000; наши данные). Северная граница ареала не выяснена. Предполагается, что она проходит в районе хр. Джугджур (Степанян 2003; Нечаев, Гамова 2009).

По опросным сведениям, полученным от местных охотников, в Охотском районе вид отмечен на островах в поймах рек



**Рис. 11.** Самец белоглазого нырка *Aythya nyroca*, добытый в окрестностях с. Смирновка (Хабаровский район) 25.09.2025. Фото В. А. Морозова.

**Fig. 11.** Male Ferruginous Duck *Aythya nyroca*, killed in the vicinity of Smirnovka village (Khabarovsk District) on 25 September 2025. Photo by V. A. Morozov



**Рис. 12.** Чучело черного коршуна *Milvus migrans*, добытого в п. Охотск в сентябре 2020 г. Экспозиция охотского краеведческого музея. Фото С. И. Бурдина.

**Fig. 12.** Mounted Black Kite *Milvus migrans*, killed in Okhotsk village in September 2020. On display at the Okhotsk Museum of Local History. Photo by S. I. Burdin



**Рис. 13.** Вальдшнеп *Scolopax rusticola*, добытый на р. Охота 01.06.2025. Фото С. И. Бурдина.

**Fig. 13.** Woodcock *Scolopax rusticola*, killed on the Okhota River on 1 June 2025. Photo by S. I. Burdin

Охота, Урак и Кухтуй, расположенных севернее данного горного образования. Здесь вальдшнеп немногочисленная, вероятно, гнездящаяся птица. Достоверной информации о размножении вида нет. Токовые полеты многократно регистрировались в конце мая — начале июня. Чаще всего птиц, кормящихся дождевыми червями, вспугивали в зарослях папоротника. Нам было представлено фото птицы, добытой на р. Охота 01.06.2025 (рис. 13).

**Удод** *Upupa epops*. Гнездовой ареал вида охватывает южную часть Евразии от Атлантики до Тихого океана и часть Африки (Степанян 2003). В Хабаровском крае северные пределы распространения, вероятно, находятся на участке от устья р. Амур до Удской губы Охотского моря. За 50-летний период наблюдений в самом северном районе края — Охотском — удод был отмечен лишь однажды. В конце сентября 2017 г. в п. Охотск была встречена одна явно залетная птица.

**Короткопалый бюльбюль** *Microscelis amaurotis*. Очень редкий залетный вид южных районов Хабаровского края. Первые регистрации короткопалого бюльбюля в регионе произошли в зимне-весенний период 2010 г., когда залетные птицы были отмечены дважды в с. Бычиха (Хабаровский район): 20 февраля — две особи и 11 марта — одна (Пронкевич и др. 2011а). В г. Хабаровск одна птица была отмечена и сфотографирована в конце декабря 2019 г. (Беляев и др. 2022).

Самым северным пунктом края, где был отмечен вид, вероятно, является с. Верхняя Эконь (Комсомольский район), расположенное в 250 км северо-восточнее Хабаровска. Здесь 04.11.2021 птицеловом-любителем И. Л. Щупиковым в паутинную сеть был отловлен короткопалый бюльбюль. Фотография технического качества, позволяющая определить вид, была передана нам.

Другой случай встречи короткопалого бюльбюля произошел в с. Бычиха 18.11.2021, когда две птицы были отмечены орнитологом С. В. Ивановым (устное сообщение).

Для территории Приморского края короткопалый бюльбюль приводится в качестве кочующего и зимующего вида, количество регистраций которого с 1960 г. приближается к 400 случаям (Беляев и др. 2022).

В Амурской области единственный залет был зарегистрирован на территории Хинганского заповедника в декабре 2009 г. (Антонов, Дугинцов 2018).

Вид гнездится на Японских островах, Тайване, Филиппинских островах, в южных и центральных районах п-ова Корея. Зимовки расположены в Восточном Китае, на п-ове Корея и Японских островах (Нечаев, Гамова 2009).

### Заключение

В результате проведенного анализа уточнены сведения о пребывании восьми видов птиц (большая белая цапля, сухонос, черная кряква, серая утка, черный коршун, чибис, вальдшнеп, удод) на краю их ареала.

Впервые получена информация о проникновении вальдшнепа в северный Охотский район, но характер его пребывания остается невыясненным.

Впервые за всю историю орнитологических исследований на территории Хабаровского края зарегистрированы залеты горного гуся, черного грифа, документально (при помощи фотографий) подтверждены залеты каравайки, огаря, белоглазого нырка.

Последняя встреча залетной египетской цапли (2024 г.) произошла в 430 и 570 км севернее предыдущих случаев, что, возможно, говорит о наметившейся тенденции проникновения вида на север.

Регулярные встречи колпиц, в том числе в весенний период, на территории Средне-амурской низменности наводят на мысль о ее возможном размножении здесь.

Несмотря на значительный рост численности белого гуся на местах размножения на о. Врангеля, на пролетных путях в Хабаровском крае его численность не растет.

Продолжились залеты на территорию региона короткопалого бюльбюля. В

2021 г. одна птица была отловлена в 250 км северо-восточнее предыдущих встреч.

### Благодарности

Авторы выражают благодарность нашим корреспондентам, предоставившим информацию о встречах залетных птиц: Е. В. Васильченко, А. В. Каплунову, М. А. Федосееву, В. А. Морозову, С. В. Иванову, И. Л. Щупикову; Е. А. Волковской-Курдюковой, А. Б. Курдюкову — за помощь в определении белоглазых нырков; Д. В. Коробову — за определение большой белой цапли по фотографии.

### Acknowledgements

The authors express their gratitude to our correspondents who provided information on encounters with stray birds: E. V. Vasilchenko, A. V. Kaplunov, M. A. Fedoseyev, V. A. Morozov, S. V. Ivanov, I. L. Shchupikov, and E. A. Volkovskaya-Kurdyukova. We also thank A. B. Kurdyukov for assistance in identifying Ferruginous Ducks, and D. V. Korobov for identifying a Great Egret from a photograph.

### Финансирование

Подготовка статьи выполнена в рамках государственного задания Министерства

науки и высшего образования Российской Федерации «Состояние природных и природно-хозяйственных систем умеренной зоны Западной Пацифики (2026–2030 гг.)» (126031118637-5).

Исследования проведены с использованием ресурсов Центра коллективного пользования «Центр исследования минерального сырья» ХФИЦ ДВО РАН, финансируемого Минобрнауки России по соглашению № 075-15-2025-621.

### Funding

The article was prepared as part of the state-commissioned assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation “The state of natural and natural-economic systems of the temperate zone of the Western Pacific (2026–2030)” (126031118637-5).

The research was conducted using the resources of the Shared Use Center ‘Mineral Resources Research Center’ of the Khabarovsk Federal Research Center, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, funded by the Russian Federation represented by the Ministry of Education and Science of Russia under agreement No. 075-15-2025-621.

### Литература

- Аверин, А. А. (2014) Огарь *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764). В кн.: Горобейко В. В. (ред.). *Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», с. 60–61.
- Антонов, А. И., Дугинцов, В. А. (2018) Аннотированный список видов птиц Амурской области. *Амурский зоологический журнал*, т. 10, № 1, с. 11–79. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2018-10-1-11-79>
- Антонов, А. И., Бабыкина, М. С., Коренюк, И. Ю. (2023) Расширение списка видов авифауны Амурской области в 2023 году. *Русский орнитологический журнал*, т. 32, № 2377, с. 5740–5743.
- Бабенко, В. Г. (2000) *Птицы Нижнего Приамурья*. М.: Прометей, 725 с.
- Беляев, Д. А., Шохрин, В. П., Дарман, Ю. А. и др. (2022) Увеличение числа встреч рыжеухого бюльбюля *Microscelis amaurotis* на Дальнем Востоке России за последние годы. *Амурский зоологический журнал*, т. 14, № 4, с. 620–631. <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-4-620-631>
- Блохин, Ю. Ю. (2011a) Горный гусь *Anser indicus*. В кн.: Е. Е. Сыроечковский (ред.). *Полевой определитель гусеобразных птиц России*. М.: Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии, с. 75.
- Блохин, Ю. Ю. (2011b) Белоглазый нырок *Aythya nyroca*. В кн.: Е. Е. Сыроечковский (ред.). *Полевой определитель гусеобразных птиц России*. М.: Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии, с. 126.
- Волковская-Курдюкова, Е. А., Курдюков, А. Б. (2025) Первые встречи белоглазого нырка *Aythya nyroca* в Приморском крае. *Русский орнитологический журнал* т. 34, № 2517, с. 1519–1528.
- Воробьев, К. А. (1954) *Птицы Уссурийского края*. М.: АН СССР, 359 с.

- Воронов, Б. А. (ред.). (2019) *Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных*. Воронеж: Мир, 604 с.
- Глущенко, Ю. Н., Нечаев, В. А., Редькин, Я. А. (2016) *Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор*. М.: КМК, 523 с.
- Голубева, А. В., Моисейкин, В. А., Глущенко, Ю. Н., Вялкин, А. В. (2025) Белоглазый нырок *Aythya nyroca* — новый вид в авифауне Приморского края. *Русский орнитологический журнал*, т. 34, № 2512, с. 1283–1285.
- Грищенко, В. Н. (2011) Большая белая цапля *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758). В кн.: В. А. Андронов, Т. Б. Ардамацкая, Ю. Б. Артюхин и др. *Птицы России и сопредельных регионов: пеликанообразные, аистообразные, фламингообразные*. М.: КМК, с. 304–339.
- Дорогой, И. В. (2013) Залёт чёрного грифа *Aegypius topachus* на юг Магаданской области. *Русский орнитологический журнал*, т. 22, № 839, с. 151–152.
- Дорогой, И. В. (2016) Новые случаи залёта чёрной кряквы *Anas poecilorhyncha* на юг Магаданской области. *Русский орнитологический журнал*, т. 25, № 1326, с. 3074–3075.
- Дорогой, И. В. (2020) Серая утка *Anas strepera* — новый вид авифауны Магаданской области. *Русский орнитологический журнал*, т. 29, № 1951, с. 3335–3337.
- Кальницкая, И. Н., Глущенко, Ю. Н., Сурмач, С. Г. (2015) Чёрный гриф *Aegypius topachus* в Приморском крае и экологические предпосылки его массовой гибели. *Русский орнитологический журнал*, т. 24, № 1179, с. 2953–2961.
- Коблик, Е. А., Редькин, Я. А., Архипов, В. Ю. (2006) *Список птиц Российской Федерации*. М.: КМК, 256 с.
- Кондратьев, А. В. (2014) Залёт чёрной кряквы *Anas poecilorhyncha* в окрестности Магадана. *Русский орнитологический журнал*, т. 23, № 1044, с. 2769–2771.
- Крюкова, М. В., Пронкевич, В. В., Махинов, А. Н., Антонов, А. Л. (2016) Природный парк «Шереметьевский»: перспективы природоохранной и рекреационной деятельности. *Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук*, № 3 (187), с. 5–14.
- Михайлов, К. Е., Коблик, Е. А. (2025) *Птицы России. Фотоопределитель*. М.: Фитон XXI, 640 с.
- Нечаев, В. А. (1991) *Птицы острова Сахалин*. Владивосток: ДВО АН СССР, 748 с.
- Нечаев, В. А., Гамова, Т. В. (2009) *Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог)*. Владивосток: Дальнаука, 564 с.
- Павлов, Д. С. (ред.). (2021) *Красная книга Российской Федерации. Животные*. 2-е изд. М.: ВНИИ Экология, 1128 с.
- Пронкевич, В. В. (2013) Новые находки редких и малоизученных птиц в Нижнем Приамурье и юго-западном Приохотье в 2012 году. *Амурский зоологический журнал*, т. 5, № 1, с. 89–93. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2013-5-1-89-93>
- Пронкевич, В. В. (2015) Новые данные о редких представителях орнитофауны Хабаровского края. *Вестник Северо-Восточного научного Центра ДВО РАН*, № 4, с. 89–94.
- Пронкевич, В. В. (2016) Современное состояние популяций гусеобразных птиц на территории Хабаровского края. *Казарка: Бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии*, т. 19-1, с. 153–200.
- Пронкевич, В. В. (2019) Новые сведения о редких видах птиц Хабаровского края. *Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН*, № 2, с. 89–98. <https://doi.org/10.34078/1814-0998-2019-2-89-98>
- Пронкевич, В. В., Воронов, Б. А. (2015) Распределение и численность птиц на основном русле Среднего и Нижнего Амура. В кн.: А. Ф. Ковшарь (ред.). *XIV Международная орнитологическая конференция Северной Евразии. I. Тезисы*. Алматы: Мензбировское орнитологическое общество, с. 394–395.
- Пронкевич, В. В., Мороков, В. Е. (2012) Заметки о птицах Охотского района Хабаровского края. *Амурский зоологический журнал*, т. 4, № 2, с. 194–196. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2012-4-2-194-196>
- Пронкевич, В. В., Росляков, В. И., Воронов, Б. А. (2011a) Результаты учета редких и малоизученных птиц в Приамурье и юго-западном Приохотье в 2011 году. *Амурский зоологический журнал*, т. 3, № 4, с. 381–385. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2011-3-4-381-385>
- Пронкевич, В. В., Зверев, С. В., Мороков, В. Е., Ткаченко, К. Н. (2016) О некоторых орнитологических находках в Хабаровском крае. *Русский орнитологический журнал*, т. 25, № 1240, с. 252–260.
- Пронкевич, В. В., Воронов, Б. А., Атрохова, Т. А. и др. (2011b) Новые данные о редких и малоизученных птицах Хабаровского края. *Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН*, № 3, с. 70–76.
- Пронкевич, В. В., Глущенко, Ю. Н., Коробов, Д. В. и др. (2024) Новые сведения о редких и малоизученных птицах залива Счастья Охотского моря и сопредельных территорий (Хабаровский край). *Амурский зоологический журнал*, т. 16, № 1, с. 220–260. <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2024-16-1-220-260>

- Розенфельд, С. Б. (2025) Гусеобразные Северной Палеарктики: структура и численность популяций, миграционные пути, проблемы охраны и неустойчивого использования. Автореферат диссертации на соискание степени доктора биологических наук. М., Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, 46 с.
- Росляков, Г. Е. (1974) Голенастые птицы Нижнего Приамурья. В кн.: *Природно-очаговые инфекции и инвазии Дальнего Востока. Вып. 3*. Хабаровск: Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии, с. 98–100.
- Росляков, Г. Е. (1981) Краткие сведения о некоторых редких и малоизученных птицах Нижнего Приамурья. В кн.: Н. М. Литвиненко (ред.). *Редкие птицы Дальнего Востока*. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, с. 112–115.
- Слепцов, Ю. А. (2018) Второй случай залёта чёрного коршуна *Milvus migrans* в Магаданскую область. *Русский орнитологический журнал*, т. 27, № 1651, с. 3836–3837.
- Степанян, Л. С. (2003) *Конспект орнитологической фауны России и сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области)*. М.: Академкнига, 808 с.
- Тильба, П. А. (2021) Чёрный гриф *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766). В кн.: Д. С. Павлов (ред.). *Красная книга Российской Федерации. Животные*. 2-е изд. М.: ВНИИ Экология, с. 643–644.
- Тиунов, И. М. (2005) *Водно-болотные и морские птицы Северного Сахалина и материкового побережья пролива Невельского. Диссертация на соискание степени кандидата биологических наук*. Владивосток, Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 235 с.
- Тиунов, И. М., Блохин, А. Ю. (2011) *Водно-болотные птицы Северного Сахалина*. Владивосток: Дальнаука, 344 с.
- Шиенок, А. Н., Парфенова, Ю. А. (2025) Новые виды птиц Джугджурского заповедника и посёлка Аян по данным 2023–2024 годов. *Русский орнитологический журнал*, т. 34, № 2580, с. 4518–4525.
- Pronkevich, V. V. (1998) Migration of waders in the Khabarovsk region of the Far East. In: H. Hötker, E. Lebedeva, P. S. Tomkovich et al. (eds.). *Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways*. Woodbridge; Cape Town: International Wader Study Group Publ., pp. 425–430.
- Pronkevich, V. V., Voronov, B. A. (2014) Number and distribution of raptors, waterfowl and shorebirds in the Middle and Lower Amur River from rafting censuses. In: K. Song, V. V. Ermoshin (eds.). *Resources, environment and regional sustainable development in Northeast Asia*. Changchun: Northeast Institute of Geography and Agroecology Publ., pp. 244–247.

## References

- Antonov, A. I., Dugintsov, V. A. (2018) Annotated bird species list of Amur Oblast. *Amurian Zoological Journal*, vol. 10, no. 1, pp. 11–79. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2018-10-1-11-79> (In Russian)
- Antonov, A. I., Babykina, M. S., Korenyuk, I. Yu. (2023) Expanding the list of birds in the Amur Region in 2023. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 32, no. 2377, pp. 5740–5743. (In Russian)
- Averin, A. A. (2014) Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764). In: V. V. Gorobeyko (ed.). *Red Data Book of the Jewish Autonomous Region. Rare and endangered species of animals*. Birobidzhan: Izdatel'skiy dom "Birobidzhan" Publ., pp. 60–61. (In Russian)
- Babenko, V. G. (2000) *Birds of the Lower Amur Region*. Moscow: Prometej Publ., 725 p. (In Russian)
- Belyaev, D. A., Shokhrin, V. P., Darman, Yu. A. et al. (2022) An increase in the number of records of the brown-eared bulbul *Microscelis amaurotis* in the Russian Far East in recent years. *Amurian Zoological Journal*, vol. 14, no. 4, pp. 620–631. <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2022-14-4-620-631> (In Russian)
- Blokhin, Yu. Yu. (2011a) Bar-headed Goose *Anser indicus*. In: E. E. Syroechkovsky (ed.). *Field guide to anseriformes of Russia*. Moscow: Goose Specialist Group of Northern Eurasia Publ., p. 75. (In Russian)
- Blokhin, Yu. Yu. (2011b) Ferruginous Duck *Aythya nyroca*. In: E. E. Syroechkovsky (ed.). *Field guide to anseriformes of Russia*. Moscow: Goose Specialist Group of Northern Eurasia Publ., p. 126. (In Russian)
- Glushchenko, Yu. N., Nechaev, V. A., Red'kin, Ya. A. (2016) *Birds of Primorsky Krai: Brief faunistic review*. Moscow: KMK Scientific Press, 523 p. (In Russian)
- Golubeva, A. V., Moiseykin, V. A., Glushchenko, Yu. N., Vyalkov, A. V. (2025) The Ferruginous Duck *Aythya nyroca* — a new species in the avifauna of Primorsky Krai. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 34, no. 2512, pp. 1283–1285. (In Russian)
- Grishchenko, V. N. (2011) Great White Egret *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758). In: V. A. Andronov, T. B. Ardamatskaya, Yu. B. Artyukhin et al. *Birds of Russia and adjacent regions: Pelecaniformes, Ciconiiformes, Phoenicopteriformes*. Moscow: KMK Scientific Press, pp. 304–339. (In Russian)

- Dorogoi, I. V. (2016) New cases of Chinese Spotbill *Anas poecilorhyncha* flying into the south of the Magadan region. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 25, no. 1326, pp. 3074–3075. (In Russian)
- Dorogoy, I. V. (2013) Vagrant Black Vulture *Aegypius monachus* in the south of Magadan Oblast. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 22, no. 839, pp. 151–152. (In Russian)
- Dorogoy, I. V. (2020) The Gadwall *Anas strepera* — a new species of avifauna of the Magadan Oblast. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 29, no. 1951, pp. 3335–3337. (In Russian)
- Kalnitskaya, I. N., Glushchenko, Yu. N., Surmach, S. G. (2015) The Cinereous Vulture *Aegypius monachus* in the Primorsky Krai and ecological conditions of its mass death. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 24, no. 1179, pp. 2953–2961. (In Russian)
- Koblik, E. A., Red'kin, Ya. A., Arkhipov, V. Yu. (2006) *Checklist of the birds of Russian Federation*. Moscow: KMK Scientific Press, 256 p. (In Russian)
- Kondratiev, A. V. (2014) The record of Vagrant Spot-Billed Duck *Anas poecilorhyncha* near Magadan. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 23, no. 1044, pp. 2769–2771. (In Russian)
- Kryukova, M. V., Pronkevich, V. V., Makhinov, A. N., Antonov, A. L. (2016) Natural Park “Sheremetyevskiy”: Prospects of environmental and recreational activities. *Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences*, no. 3 (187), pp. 5–14. (In Russian)
- Mikhailov, K. E., Koblik, E. A. (2025) *Birds of Russia. Photo guide*. Moscow: Fiton XXI Publ., 640 p. (In Russian)
- Nechaev, V. A. (1991) *Birds of Sakhalin Island*. Vladivostok: Far Eastern Branch of the Academy of Sciences of the USSR Publ., 748 p. (In Russian)
- Nechaev, V. A., Gamova, T. V. (2009) *Birds of the Russian Far East (annotated catalogue)*. Vladivostok: Dalnauka Publ., 564 p. (In Russian)
- Pavlov, D. S. (ed.). (2021) *Red Data Book of the Russian Federation. Animals*. 2<sup>nd</sup> ed. Moscow: VNIIEcology Publ., 1128 p. (In Russian)
- Pronkevich, V. V. (1998) Migration of waders in the Khabarovsk region of the Far East. In: H. Hötter, E. Lebedeva, P. S. Tomkovich et al. (eds.). *Migration and international conservation of waders. Research and conservation on north Asian, African and European flyways*. Woodbridge; Cape Town: International Wader Study Group Publ., pp. 425–430. (In English)
- Pronkevich, V. V. (2013) New records of rare and poorly known birds from Lower Amur and South-Western Priokhotye in 2012. *Amurian Zoological Journal*, vol. 5, no. 1, pp. 89–93. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2013-5-1-89-93> (In Russian)
- Pronkevich, V. V. (2015) New data about rare representatives of the Khabarovsk Krai avifauna. *The Bulletin of the North-East Scientific Center*, no. 4, pp. 89–94. (In Russian)
- Pronkevich, V. V. (2016) Current status of waterfowl populations in Khabarovsk Krai, Russia. *Casarca*, vol. 19-1, pp. 153–200. (In Russian)
- Pronkevich, V. V. (2019) New data on rare birds of Khabarovsk Krai. *The Bulletin of the North-East Scientific Center*, no. 2, pp. 89–98. <https://doi.org/10.34078/1814-0998-2019-2-89-98> (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Morokov, V. E. (2012) The sketch of birds of the Okhotsky District, Khabarovsk Krai. *Amurian Zoological Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 194–196. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2012-4-2-194-196> (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Voronov, B. A. (2014) Number and distribution of raptors, waterfowl and shorebirds in the Middle and Lower Amur River from rafting censuses. In: K. Song, V. V. Ermoshin (eds.). *Resources, environment and regional sustainable development in Northeast Asia*. Changchun: Northeast Institute of Geography and Agroecology Publ., pp. 244–247. (In English)
- Pronkevich, V. V., Voronov, B. A. (2015) Distribution and abundance of birds on the main channel of the Middle and Lower Amur. In: A. F. Kovshar (ed.). *XIV International Ornithological conference of Northern Eurasia. I. Abstracts*. Almaty: Menzbier Ornithological Society Publ., pp. 394–395. (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Roslyakov, V. I., Voronov, B. A. (2011a) Results of registration of rare and insufficiently studied birds in Priamurje and South-Western Priokhotje Region in 2011. *Amurian Zoological Journal*, vol. 3, no. 4, pp. 381–385. <https://doi.org/10.33910/1999-4079-2011-3-4-381-385> (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Zverev S. V., Morokov, V. E., Tkachenko, K. N. (2016) Some ornithological discoveries in the Khabarovsk Krai. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 25, no. 1240, pp. 252–260. (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Voronov, B. A., Atrokhova, T. A. et al. (2011b) New data on rare and poorly known birds in Khabarovsk Territory. *The Bulletin of the North-East Scientific Center*, no. 3, pp. 70–76. (In Russian)
- Pronkevich, V. V., Glushchenko, Y. N., Korobov, D. V. et al. (2024) New data on rare and insufficiently studied birds of the Shchastya Bay, the Sea of Okhotsk, and adjacent territories (Khabarovsk Krai). *Amurian Zoological Journal*, vol. 16, no. 1, pp. 220–260. <https://doi.org/10.33910/2686-9519-2024-16-1-220-260> (In Russian)

- Roslyakov, G. E. (1974) Ciconiiform birds of the Lower Amur Region. In: *Natural focal infections and infestations of the Far East. Iss. 3*. Khabarovsk: Khabarovsk Research Institute of Epidemiology and Microbiology Publ., pp. 98–100. (In Russian)
- Roslyakov, G. E. (1981) Brief information about some rare and insufficiently studied birds of the Lower Amur region. In: N. M. Litvinenko (ed.). *Rare birds of the Far East*. Vladivostok: Far Eastern Scientific Center of the Academy of Sciences of the USSR Publ., pp. 112–115. (In Russian)
- Rozenfeld, S. B. (2025) *Anseriformes of the Northern Palearctic: Population structure and abundance, migration routes, conservation issues, and sustainable use. Extended abstract of PhD dissertation (Biology)*. Moscow, A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 46 p. (In Russian)
- Shienok, A. N., Parfenova, Yu. A. (2025) New bird species of the Dzhugdzhursky Nature Reserve and the village of Ayan according to data from 2023–2024. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 34, no. 2580, pp. 4518–4525. (In Russian)
- Sleptsov, Yu. A. (2018) The second registration of Vagrant Black Kite *Milvus migrans* in the Magadan Oblast. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 27, no. 1651, pp. 3836–3837. (In Russian)
- Stepanyan, L. S. (2003) *Conspectus of the ornithological fauna of Russia and adjacent territories (within the borders of the USSR as a historic region)*. Moscow: Akademkniga Publ., 808 p. (In Russian)
- Tilba, P. A. (2021) The Black Vulture *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766). In: D. S. Pavlov (ed.). *Red Data Book of the Russian Federation. Animals*. 2<sup>nd</sup> ed. Moscow: VNI Ecology Publ., pp. 643–644. (In Russian)
- Tiunov, I. M. (2005) *Waterbirds and seabirds of Northern Sakhalin and the mainland coast of the Nevelskoy Strait. PhD dissertation (Biology)*. Vladivostok, Institute of Biology and Soil Science, FEB RAS, 235 p. (In Russian)
- Tiunov, I. M., Blokhin, A. Yu. (2011) *Waterbirds of Northern Sakhalin*. Vladivostok: Dalnauka Publ., 344 p. (In Russian)
- Volkovskaya-Kurdyukova, E. A., Kurdyukov, A. B. (2025) First sightings of the Ferruginous Duck *Aythya nyroca* in Primorsky Krai. *The Russian Journal of Ornithology*, vol. 34, no. 2517, pp. 1519–1528. (In Russian)
- Vorobiev, K. A. (1954) *Birds of the Ussuri region*. Moscow: Academy of Sciences of the USSR Publ., 359 p. (In Russian)
- Voronov, B. A. (ed.). (2019) *Red Data Book of the Khabarovsk Territory. Rare and endangered species of plants, mushrooms and animals*. Voronezh: Mir Publ., 604 p. (In Russian)

**Для цитирования:** Пронкевич, В. В., Бурдин, С. И. (2026) О встречах периферийных и залетных видов птиц на территории Хабаровского Края. *Амурский зоологический журнал*, т. XVIII, № 1, с. 328–348. <https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-1-328-348>

**Получена** 12 февраля 2026; прошла рецензирование 16 марта 2026; принята 18 марта 2026.

**For citation:** Pronkevich, V. V., Burdin, S. I. (2026) About registrations of peripheral and stray bird species in Khabarovsk Krai. *Amurian Zoological Journal*, vol. XVIII, no. 1, pp. 328–348. <https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-1-328-348>

**Received** 12 February 2026; reviewed 16 March 2026; accepted 18 March 2026.