



Check for updates

<https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-3-978-981>
<https://www.zoobank.org/References/BFFFC3C6-7713-441F-BB4F-3B379B95329E>

УДК 598.241.1

Лысуха (*Fulica atra*) Linnaeus, 1758 — новый вид орнитофауны Магаданской области

Ю. А. Слепцов

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, ул. Портовая, д. 18, 685000, г. Магадан, Россия

Сведения об авторе

Слепцов Юрий Александрович

E-mail: slep-u@yandex.ru

SPIN-код: 5291-3453

ResearcherID: JWA-2506-2024

ORCID: 0009-0006-9051-5682

Аннотация. Приводятся первые документальные свидетельства регистрации лысухи (*Fulica atra*) в Магаданской области. Данная встреча дополняет список орнитофауны региона новым редким залетным видом. Во многих местах северо-востока России, за исключением Приморского края, наблюдается сокращение численности лысухи. Появление вида в окрестностях Магадана предположительно связано с отклонением к востоку от основных путей весенней миграции. Ближайшие места ее гнездования находятся примерно в 800–900 километрах на запад или юго-запад.

Права: © Автор (2026). Опубликовано Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена. Открытый доступ на условиях лицензии CC BY 4.0.

Ключевые слова: лысуха, Магаданская область, залет, новый вид, орнитофауна

The common coot (*Fulica atra*) Linnaeus, 1758: A new species for Magadan Oblast

Yu. A. Sleptsov

Institute of Biological Problems of the North of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, 18 Portovaya Str., 685000, Magadan, Russia

Author

Yuri A. Sleptsov

E-mail: slep-u@yandex.ru

SPIN: 5291-3453

ResearcherID: JWA-2506-2024

ORCID: 0009-0006-9051-5682

Abstract. The paper presents the first documented evidence of the common coot (*Fulica atra*) in Magadan Oblast. This finding adds a new rare vagrant species to the region's avifauna. In many areas of northeastern Russia, with the exception of Primorsky Krai, there has been a decline in coot numbers. The appearance of this species near Magadan is believed to be the result of a deviation from the main spring migration routes to the east. The nearest known nesting sites are approximately 800–900 kilometers to the west or southwest.

Copyright: © The Author (2026). Published by Herzen State Pedagogical University of Russia. Open access under CC BY License 4.0.

Keywords: common coot, Magadan Oblast, vagrant, new species, avifauna

Гнездовой ареал лысухи (*Fulica atra*) занимает обширную территорию в Евразии, Северной Африке, Австралии и Новой Зеландии. Обитающий в России единственный подвид *Fulica atra atra* на Дальнем Востоке распространен в бассейне Амура, на островах Сахалин и Кунашир, а также в западных, южных и восточных районах Приморья. Залеты лысухи зарегистрированы в Охотске и на Камчатке. Зимовки расположены в Южной и Юго-Восточной Азии (Нечаев, Гамова 2009).

В Магаданской области единственное упоминание о лысухе имеется в списке А. П. Васьковского, где автор приводит ее в качестве залетного вида для горной части северного Охотоморья и таежной части Яно-Тауйской депрессии (Васьковский 1966). Сведения о характере пребывания, конкретном месте и времени встречи птицы в публикации отсутствуют. Скорее всего, по этой причине во всех последующих обобщающих сводках вид для региона не упоминается (Кищинский 1968; Андреев и др. 2006; Нечаев, Гамова 2009).

Никакой информации, в том числе и от местных жителей, не поступало вплоть до недавнего времени, когда днем 21 мая 2026 г. одиночная особь лысухи была встречена на небольшом пресном водоеме в нижнем течении р. Магаданка (N 59°33'0,18; E 150°52'55,29). Птица сидела на поверхности воды и при приближении наблюдателя скрылась в сухой прошлогодней траве. На этом же водоеме присутствовали в единичном количестве чирки-свистунки (*Anas crecca*) и кряквы (*Anas platyrhynchos*). При дальнейшем подходе лысуха взлетела с близкого расстояния, что позволило получить фотографии, и улетела в направлении моря (рис. 1).

В последний раз птица была зарегистрирована в этом районе 29 мая. Днем 31 мая одиночную лысуху наблюдал А. В. Кондратьев в окрестностях пос. Армань (N 59°41'17,31; E 150°5'23,63), в 50 км к северо-западу от места первой встречи. Птица находилась на небольшом пресном водоеме, где обитают красношейные



Рис. 1. Лысуха в низовьях р. Магаданка, 21.05.2026 г. Фото П. Х. Балько

Fig. 1. Common coot in the lower reaches of the Magadanka River, 21.05.2026. Photo by P. Ch. Balko

поганки (*Podiceps auritus*). Последняя ее встреча отмечена здесь 7 июня.

На северо-востоке России численность и границы распространения вида подвержены постоянным изменениям. Во многих местах лысуха имеет охранный статус и занесена в региональные Красные книги. В Якутии до середины 90-х гг. прошлого века лысуха регулярно гнездилась в окрестностях Якутска, в районе Олекминска и на Лено-Амгинском междуречье. Считалась многочисленной в районе с. Сунтар. Но спустя несколько лет во многих этих районах вид стал либо малочисленным, либо совсем исчез (Дегтярев 2007; Винокуров 2019). И лишь в 2017–2019 гг. от местных жителей стали поступать сведения, демонстрирующие некоторое восстановление численности (Шемякин 2019). Это происходит и в настоящее время, о чем свидетельствуют многочисленные встречи лысухи весной 2026 г. (Е. В. Шемякин, личное сообщение). В бассейне Амура на территории Амурской области и Хабаровского края также произошли заметные сокращения численности и мест обитания вида, что связывается с уменьшением гнездопригодных биотопов и браконьерством (Стрельцов 2009; Воронов 2019). Для о. Сахалин лысуха ранее указывалась как редкий гнездящийся вид в центральных и южных районах острова (Нечаев 1991). В настоящее время в результате сокращения численности наблюдаются только мигрирующие птицы (Ефанов 2016; П. С. Ктиторov, личное сообщение). Единственным регионом, где лысуха является обычным гнездящимся видом на Дальнем Востоке России, является Приморский край с размещением крупнейшей гнездовой группировки в Приханкайской низменности. Но на оз. Ханка

существуют колебания численности лысухи, которые отражаются в ее увеличении в полноводные годы и уменьшении в засушливые сезоны (Глущенко и др. 2016).

Таким образом, ближайшие места гнездования лысухи находятся примерно в 800 км к западу в Якутии и в 900 км к юго-западу в Приамурье от места встречи в Магадане. Наличие залетов некоторых видов (стерх (*Grus leucogeranus*), чибис (*Vanellus vanellus*)) в Охотске позволяет объяснить появление и лысухи под Магаданом в результате отклонения птиц к востоку от основных маршрутов во время перемещения весной на север. Данная встреча дополняет общий список орнитофауны Магаданской области новым редким залетным видом.

Благодарности

Автор благодарит П. Х. Балько, П. С. Ктиторову, Е. В. Шемякина и А. В. Кондратьева за предоставленную информацию и помощь в работе.

Acknowledgements

The author thanks P. Ch. Balko, P. S. Ktitorov, E. V. Shemyakin, and A. V. Kondratyev for the information provided.

Финансирование

Работа выполнена по государственному заданию ИБПС ДВО РАН (НИОКТР 123032000020-7).

Funding

This study is part of the state-commissioned assignment to the Institute of Biological Problems of the North of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences (number NIOKTR 123032000020-7).

Литература

- Андреев, А. В., Докучаев, Н. Е., Кречмар, А. В., Чернявский, Ф. Б. (2006) *Наземные позвоночные Северо-Востока России*. Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 315 с.
- Васьковский, А. П. (1966) Список и географическое распространение птиц Крайнего Северо-Востока СССР. В кн.: В. И. Першин (ред.). *Краеведческие записки. Вып. 6*. Магадан: Магаданское книжное издательство, с. 84–124.
- Винокуров, В. В. (ред.). (2019) *Красная книга Республики Саха (Якутия). Т. 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных*. М.: Наука, 270 с.
- Воронов, Б. А. (ред.). (2019) *Красная книга Хабаровского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, грибов и животных*. Воронеж: Мир, 604 с.

- Глущенко, Ю. Н., Нечаев, В. А., Редькин, Я. А. (2016). *Птицы Приморского края: краткий фаунистический обзор*. М.: КМК, 523 с.
- Дегтярев, В. Г. (2007) *Водно-болотные птицы в условиях криоаридной равнины*. Новосибирск: Наука, 291 с.
- Ефанов, В. Н. (ред.). (2016) *Красная книга Сахалинской области. Животные*. М.: Буки Веди, 252 с.
- Кишинский, А. А. (1968) *Птицы Колымского нагорья*. М.: Наука, 188 с.
- Нечаев, В. А. (1991) *Птицы острова Сахалин*. Владивосток: ДВО АН СССР, 748 с.
- Нечаев, В. А., Гамова, Т. В. (2009) *Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог)*. Владивосток: Дальнаука, 564 с.
- Стрельцов, А. Н. (ред.). (2009) *Красная книга Амурской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов*. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 446 с.
- Шемякин, Е. В. (2019) К распространению лысухи и зимородка в Якутии. *Фауна Урала и Сибири*, № 2, с. 186–188.

References

- Andreev, A. V., Dokuchaev, N. E., Krechmar, A. V., Chernyavsky, F. B. (2006) *Terrestrial Vertebrates of North-East Russia*. Magadan: NESF FEB RAS Publ., 315 p. (In Russian)
- Degtyarev, V. G. (2007) *Waterbirds in conditions of cryoaridic lowland*. Novosibirsk: Nauka Publ., 291 p. (In Russian)
- Gluschenko, Yu. N., Nechaev, V. A., Red'kin, Ya. A. (2016) *Birds of Primorsky Krai: Brief review of the fauna*. Moscow: KMK Scientific Press, 523 p. (In Russian)
- Kistschinsky, A. A. (1968) *Birds of the Kolyma Highlands*. Moscow: Nauka Publ., 188 p. (In Russian)
- Nechaev, V. A. (1991) *Birds of Sakhalin island*. Vladivostok: FEB AS USSR Publ., 748 p. (In Russian)
- Nechaev, V. A., Gamova, T. G. (2009) *Birds in Russia's Far East (an annotated catalogue)*. Vladivostok: Dalnauka Publ., 564 p. (In Russian)
- Efanov, V. N. (ed.). (2016) *Red Data Book of Sakhalin Region. Animals*. 2nd ed. Moscow: Buki Vedi Publ., 252 p. (In Russian)
- Shemyakin, E. V. (2019) To the distribution of coot and kingfisher in Yakutia. *Fauna of the Urals and Siberia*, no. 2, pp. 186–188. (In Russian)
- Streltsov, A. N. (ed.). (2009) *Red Data Book of the Amur Region. Rare and endangered species of animals, plants and fungi*. Blagoveshchensk: Blagoveshchensk State Pedagogical University Publ., 446 p. (In Russian)
- Vas'kovskij, A. P. (1966) List and geographical distribution of birds on the Far North-East of the USSR. In: V. I. Pershin (ed.). *Local history notes. Iss. 6*. Magadan: 'Magadanskoe knizhnoe izdatel'stvo' Publ., pp. 84–124. (In Russian)
- Vinokurov, N. N. (ed.). (2019) *Red Data Book of the Republic of Sakha (Yakutia). Vol. 2. Rare and endangered animal species*. Moscow: Nauka Publ., 270 p. (In Russian)
- Voronov, B. A. (ed.). (2019) *Red Data Book of the Khabarovsk Territory. Rare and endangered species of plants, mushrooms and animals*. Voronezh: Mir Publ., 604 p. (In Russian)

Для цитирования: Слепцов, Ю. А. (2026) Лысуха (*Fulica atra*) Linnaeus, 1758 — новый вид орнитофауны Магаданской области. *Амурский зоологический журнал*, т. XVIII, № 3, с. 978–981. <https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-3-978-981>

Получена 9 июня 2026; прошла рецензирование 8 июля 2026; принята 16 июля 2026.

For citation: Sleptsov, Yu. A. (2026) The common coot (*Fulica atra*) Linnaeus, 1758: A new species for Magadan Oblast. *Amurian Zoological Journal*, vol. XVIII, no. 3, pp. 978–981. <https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2026-18-3-978-981>

Received 9 June 2026; reviewed 8 July 2026; accepted 16 July 2026.